

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

(AUDE, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.258-57

25 F

N° 83 - AOUT 1967/30

I° supplément

LP 28-8-67 675799

MOUCHE DES FRUITS

Les captures continuent en petit nombre soit en Roussillon soit à Montpellier. C'est pourquoi la protection des fruits doit être assurée en respectant les délais d'emploi des insecticides efficaces, soit 7 jours pour Fenthion, Malathion, D.D.D., Trichlorfon, Methoxychlore, Diméthinate et Formotion ; 15 jours pour D.D.T.

TORDEUSE ORIENTALE

La protection des fruits récoltés fin septembre début octobre doit continuer d'être assurée.

MOUCHE DE L'OLIVE

Effectuer un traitement dès réception du présent bulletin, le renouveler 10 - 12 jours après.

L.L.TROUILLON

CARPOCAPSE DES POIRES ET POMMES

Poursuivre la lutte dans les vergers qui seront cueillis après le 1° septembre.

ZEUZERE

L'insecte est actif dans les vergers; continuer les applications insecticides sans négliger les vergers où la cueillette est terminée et les jeunes arbres.

P. BERVILLE

P.274

CULTURES MARAICHÈRES

INFORMATIONS

Jaunissement des melons :

Au cours des mois de juin et juillet nous avons constaté, à de nombreuses reprises, des cultures de melon qui jaunissaient et dépérissaient.

Dans la plupart des cas il s'agissait d'attaques de fusariose caractérisées se traduisant par un jaunissement soit total, soit partiel et unilatéral des plants.

La maladie a été particulièrement favorisée cette année par un printemps frais, peu propice à une bonne végétation des melons et survenant lors des chocs physiologiques (repiquage, retrait des films plastiques, etc...)

Par ailleurs d'autres jaunissements ont été également observés mais d'origine différente (viruses, carences, déséquilibres en eau, etc...)

Dans le cas de fusariose des mesures préventives peuvent être appliquées (méthodes culturales, désinfection du sol, rotation des cultures, etc...) Nous en reparlerons l'an prochain avant la culture des melons.

Teigne du poireau :

La Teigne, en recrudescence ces temps ci, manifeste une très grande activité. Nous recommandons aux maraîchers de surveiller attentivement leurs cultures et d'exécuter, sans faute, les traitements déjà préconisés dans de précédents bulletins.

P. CHRESTIAN - J. LAVY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Montpellier le 23 Août 1967

Imprimerie de la Station du Languedoc Roussillon. Le Directeur Gérant : L. BOUYX

Nous attirons l'attention de nos abonnés sur le changement de l'intitulé de notre

C.C.P. : REGISSEUR DE RECETTES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE DE L'HERAULT
16 rue de la République MONTPELLIER
N° 5238.57 MONTPELLIER